

1 Элементарные расширения

Зафиксируем некоторую сигнатуру и будем рассматривать структуры и теории с этой сигнатурой. Основным отношением, с которым мы продолжаем работать, является отношение истинности формулы Φ в структуре M ; обозначение $M \models \Phi$.

Определение 1. Пусть M — структура.

Тогда $Th(M)$ — теория структуры M — множество высказываний, выполненных в структуре M .

Теория $Th(m)$ множества структур m состоит из высказываний, выполненных в каждой структуре множества.

Пусть ϕ — теория (произвольное множество высказываний).

Тогда $Mod(\phi)$ — класс всех моделей теории ϕ .

Таким образом, у нас есть два отображения: $Th(m)$ — из множеств структур в теории и $Mod(\phi)$ — из теорий в множества структур.

Задача 1. Докажите, что

- Отображения Th, Mod — (нестрого) монотонно убывающие (другими словами — антимонотонные).
- $m \subseteq Mod(\phi) \iff \phi \subseteq Th(m)$;
- $\phi \subseteq Th(Mod(\phi))$;
- $m \subseteq Mod(Th(m))$.

Подсказка. Главное понятие, которое здесь нужно — это истинность высказывания в структуре. Обратитесь к своим содержательным представлениям, если нужно — к формальным определениям.

Определение 2. Пусть заданы два произвольных частично упорядоченных множества, элементы первого обозначим ϕ , второго — m .

О паре отображений $\langle Th, Mod \rangle$, для которых выполнено утверждение последней задачи, говорят, что они образуют соответствие Галуа (антимонотонное) между этими множествами.

Определение 3. (Напоминание) Структуры (элементарно) эквивалентны, если их теории совпадают.

Задача 2. Докажите, что:

- структура M' эквивалентна структуре M тогда и только тогда, когда $M' \models Th(M)$;

Определение 4. (Напоминание) *Подструктура структуры:*

- сигнатура у подструктуры та же, что и у структуры;
- универсум подструктуры — подмножество (под-универсум) универсума структуры;
- значения имен объектов лежат в под-универсуме и одинаковы для структуры и подструктуры;
- значения имен отношений совпадают на под-универсуме.

Определение 5. Для всякой структуры M назовем M с именами структуру M^\circledast , сигнатура которой получается из исходной сигнатуры добавлением имен для всех элементов носителя M , которые не имели имен в исходной сигнатуре.

Таким образом, в случае $M = \langle Q, \{<\} \rangle$, теория $Th(M^\circledast)$, кроме $Th(M)$, будет содержать всевозможные высказывания вида $0 < 1; 0.5 < 0.75; \dots; \exists x(0 < x \wedge x < 0.00001)$ и так далее.

Определение 6. (Напоминание) Пусть $M_1 = \langle D_1, \Sigma, \mathbb{Z}n_1 \rangle$ — подструктура структуры $M = \langle D, \Sigma, \mathbb{Z}n \rangle$. M — называется *элементарным расширением* M_1 если:

- M_1 — подструктура M ;
- значения в обеих структурах любой формулы $\Phi(x)$ совпадают на элементах подструктуры: $M \models \Phi(a) \iff M_1 \models \Phi(a)$ для любого набора a имен элементов D_1 .

В этом случае также M_1 называется *элементарной подструктурой* M .

Задача 3. Докажите, что:

- структура M' является элементарным расширением структуры M тогда и только тогда, когда $M' \models Th(M^\circledast)$.

Очевидное замечание:

Задача 4. Если структура M является элементарным расширением структуры M_1 , то эти две структуры эквивалентны.

Естественно возникает следующий вопрос:

Существуют ли такие структуры M и M_1 , что:

(1) M_1 — подструктура M , и M_1 эквивалентна M , но

(2) M_1 не является элементарной подструктурой M ?

Мы ответим на этот вопрос позднее.

Следующая важная теорема в некотором смысле сводит вопрос об элементарном расширении к частному случаю квантора существования. В ее формулировке и доказательстве мы будем, как это часто делается в математике не различать объекты и их имена, говоря о подстановке объекта в формулу, будем подразумевать подстановку соответствующего имени.

Задача 5. Критерий Тарского – Воота

Пусть $M_1 = \langle D_1, \Sigma, \exists_{n_1} \rangle$ — подструктура структуры $M = \langle D, \Sigma, \exists_n \rangle$. Следующие два условия эквивалентны:

(1) M — элементарное расширение структуры M_1 ;

(2) для любой формулы $\Phi(x, y)$, где x — набор переменных и y — переменная, и для любого набора a элементов D_1 :

$M \models \Phi(a, b)$ для некоторого $b \in D \Rightarrow M \models \Phi(a, b)$ для некоторого $b \in D_1$.

Подсказка. (1) \Rightarrow (2)

Рассмотрите формулу с квантором существования по y , воспользуйтесь определением элементарного расширения.

(2) \Rightarrow (1)

Попробуйте доказывать индукцией по построению формулы. Полезно при этом считать, что в (2) утверждается не только импликация, но и сразу вытекающая из нее эквивалентность.

Можем ли мы для конечной или счетной сигнатуры с помощью конечного или счетного числа высказываний описать структуру, которая обязательно будет несчетной? Оказывается — нет!

Задача 6. Теорема Лёвенгейма – Сколема об элементарной подструктуре

Любая бесконечная структура с конечной или счетной сигнатурой содержит счетную элементарную подструктуру.

Подсказка. Будем строить подструктуру так, чтобы потом использовать критерий Тарского – Воота.

Что мы положим в подструктуру?

- Все элементы, для которых уже были имена.
- Все элементы, которые должны найтись по критерию Тарского – Воота — условию (2).

- Повторим счетное число раз.
- Возьмем объединение.

Достаточно ли этого?

В этом плане речь идет о последовательности элементарных расширений. Для его реализации нам будет полезно следующее естественное определение.

Определение 7. Пусть дана конечная или счетная последовательность структур, где каждая структура является подструктурой следующей. *Объединением* этой последовательности является структура, у которой универсумом является объединение (неубывающей) последовательности универсумов членов последовательности; значение каждого имени объекта берется из первой структуры, а значением каждого имени отношения является объединение значений этого имени в элементах последовательности (в каждом элементе — это подмножество прямой степени соответствующего универсума, прямые степени тоже не убывают).

Заметим, что объединение возрастающей цепочки мы уже использовали несколько раз (где?). Эта **большая идея** нам еще пригодится.

Теорема компактности (Мальцева) (Напоминание)

Если любое конечное подмножество теории выполнимо, то теория выполнима.

Из определения следствия и теоремы компактности мы на прошлом занятии легко получили утверждение следующей задачи, которое можно было бы назвать Теоремой компактности для следствий.

Задача 7. Если высказывание следует из теории, то это высказывание следует из некоторой конечной ее части.

Подсказка. Мы уже решали похожую задачу в случае только счетных теорий.

Задача 8. Теорема Лёвенгейма – Сколема об элементарном расширении

Для любой бесконечной нормальной структуры с конечной или счётной сигнатурой существует элементарное нормальное расширение сколь угодно большой мощности.

Подсказка.

- Для данной структуры M рассмотрите теорию $Th(M^*)$
- Следующий шаг: добавим имен, сколько нужно до нужной мощности. Добавим к теории $Th(M^*)$ требование различия (неравенства) для новых имен.
- Теорема компактности (недоказанная для произвольной мощности, но мы разрешаем себе ее использовать) дает существование модели как минимум нужной мощности.